Messgröße/ Normal- bzw. Referenzbereich	**EDV**	**Probe**	**Methode**
Albumin **s. Befundbericht** Probengefäß: Nativröhrchen Messgröße in dieser Matrix nicht akkreditiert.	PALB	Erguss	Farbtest (Bromkresolgrün)
Amylase **s. Befundbericht** Probengefäß: Nativröhrchen Messgröße in dieser Matrix nicht akkreditiert.	PAMY	Erguss	Absorptionsspektrometrie (Substrat EPS)
CA 19-9 **s. Befundbericht** Probengefäß: Nativröhrchen Messgröße in dieser Matrix nicht akkreditiert.	PC199	Erguss	ECLIA
CEA **s. Befundbericht** Probengefäß: Nativröhrchen Messgröße in dieser Matrix nicht akkreditiert.	PCEA	Erguss	ECLIA
Eiweiss, gesamt **s. Befundbericht** Probengefäß: Nativröhrchen Messgröße in dieser Matrix nicht akkreditiert.	PEIW	Erguss	Biuret

Glucose **s. Befundbericht** Probengefäß: 2,7 ml Fluorid-Monovette, gelb Messgröße in dieser Matrix nicht akkreditiert.	PGLU	Erguss	Enzymatischer UV-Test (Hexokinase-/G6-PDH)
Laktat **s. Befundbericht** Probengefäß: 2,7 ml Fluorid-Monovette, gelb Messgröße in dieser Matrix nicht akkreditiert.	PLAC	Erguss	Enzymatische Bestimmung des L-Lactats
LDH **s. Befundbericht** Probengefäß: Nativröhrchen Messgröße in dieser Matrix nicht akkreditiert.	PLDH	Erguss	Enzymatischer UV-Test / IFCC
Lipase **s. Befundbericht** Probengefäß: Nativröhrchen Messgröße in dieser Matrix nicht akkreditiert.	PLIP	Erguss	Absorptionsspektrometrie
pH-Wert **s. Befundbericht** Probengefäß: Monovette für Blutgas-Bestimmung, orange, Lithium-Heparinat, spezielle Präparation Messgröße in dieser Matrix nicht akkreditiert.	PPH	Erguss	pH-Elektrode

Triglyceride **s. Befundbericht** Probengefäß: Nativröhrchen Messgröße in dieser Matrix nicht akkreditiert.	PTRI	Erguss	Enzymatischer Farbtest (GPO-PAP)
Zellzahl Leukozyten / kernhaltige Zellen Erythrozyten **s. Befundbericht** Probengefäß: 2,7 ml EDTA-Monovette, rot	PLEUBF PERYBF	Erguss	Fluoreszenzdurchfluss-zytometrie mittels Halb-leiterlasertechnologie Widerstandsmessprinzip unter hydrodynamischer Fokussierung

Die Ergebnisse aus Ergussflüssigkeiten (Pleuraerguss, Ascites, Gelenkpunktat) sollten mit den entsprechenden Befunden aus dem Blut verglichen werden. Die Blutentnahme sollte zeitnah (+/- 0,5h) nach/vor der Punktion erfolgen.